

Notice publique PERDOLAN - ADULTES

Lisez attentivement cette notice jusqu'à la fin car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament est délivré sans ordonnance. Néanmoins, vous devez utiliser PERDOLAN de la manière appropriée pour en obtenir les meilleurs résultats.

- *Conservez cette notice. Vous en aurez peut-être à nouveau besoin ultérieurement.*
- *Consultez votre pharmacien si vous avez besoin d'une information ou d'un conseil.*
- *Visitez votre médecin si les symptômes s'aggravent ou ne diminuent pas après quelques jours*

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que PERDOLAN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Que devez-vous savoir avant d'utiliser PERDOLAN ?
3. Comment utilise-t-on PERDOLAN ?
4. Effets indésirables possibles lors de l'utilisation de PERDOLAN
5. Comment doit-on conserver PERDOLAN?
6. Information complémentaire

PERDOLAN adultes 500 mg, suppositoires PERDOLAN adultes 500 mg, comprimés PERDOLAN 500 mg, comprimés effervescents

La substance active est le paracétamol.

Les suppositoires *adultes* contiennent 500 mg de paracétamol par suppositoire.

Autres composants : silicium colloïdal anhydre, glycérides semi-synthétiques, polysorbate 20, butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluène.

Les comprimés contiennent 500 mg de paracétamol par comprimé.

Autres composants : cellulose microcristalline, polyvidone K30, croscarmellose de sodium, dioxyde de silicium colloïdal, stéarate de magnésium.

Les comprimés effervescents contiennent 500 mg de paracétamol par comprimé.

Autres composants : aspartame, acide citrique anhydre, arôme d'orange, mannitol, macrogol 6000, carbonate de potassium, bicarbonate de potassium, povidone K30, saccharine de sodium, siméticone, carbonate de sodium anhydre, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, citrate de sodium, laurylsulfate de sodium.

Titulaire d'enregistrement

Johnson & Johnson Consumer SA

Roderveldlaan 1

2600 Berchem

Fabricant

Suppositoires pour adultes, comprimés

Cilag AG

Hochstrasse 201

8205 Schaffhausen

Suisse

Comprimés effervescents

Hermes Pharma GmbH

Allgäu 36

9400 Wolfsberg

Autriche

Numéro d'enregistrement

Suppositoires Adultes: BE 147691

Comprimés: BE145853

Comprimés effervescents: BE232215

1. Qu'est-ce que PERDOLAN et dans quels cas est-il utilisé ?

Suppositoires:

Les suppositoires *adultes* sont disponibles en emballage de 12 suppositoires ;

Comprimés

Les comprimés sont disponibles en emballages alvéolés de 20 et 30 comprimés et en emballage clinique de 100 comprimés.

Comprimés effervescents:

Les comprimés effervescents sont disponibles en emballage de 20 comprimés effervescents rainurés.

PERDOLAN est un antidouleur et un fébrifuge (c.-à-d. qui fait baisser la fièvre).

PERDOLAN est indiqué pour soulager la douleur et la fièvre.

En tant que médicament contre la douleur et la fièvre, PERDOLAN constitue une alternative adéquate et sûre pour les personnes hypersensibles à l'acide acétylsalicylique ou pour celles qui, pour certaines raisons (maux d'estomac ou ulcère d'estomac existants, traitement en cours par des produits anticoagulants, asthme), ne devraient pas prendre de médicaments qui contiennent des substances telles que l'acide acétylsalicylique.

2. Que devez-vous savoir avant d'utiliser PERDOLAN ?

N'utilisez pas PERDOLAN dans les cas suivants :

- si vous présentez des troubles graves des reins ou du foie. Dans ce cas, un médecin doit de toute manière être consulté ;
- si vous êtes hypersensible à l'un des composants de PERDOLAN, au paracétamol ou à la phénacétine.

Faites bien attention avec PERDOLAN :

- si vous souffrez d'une grave maladie du foie ;
- si vous prenez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique "Utilisation de PERDOLAN en association avec d'autres médicaments"

Ce médicament contient du paracétamol. Evitez tout usage prolongé et arrêtez le traitement dès que la douleur ou la fièvre a disparu. Ne dépassez pas les doses prescrites ou recommandées. Si la douleur ou la fièvre persiste, consultez votre médecin.

Les comprimés effervescents PERDOLAN contiennent une petite quantité de sodium (144 mg/comprimé). Les personnes qui suivent un régime strict pauvre en sel doivent d'abord consulter leur médecin.

Consultez votre médecin si l'un des avertissements ci-dessus s'applique à vous, ou s'est appliqué à vous dans le passé.

Utilisation de PERDOLAN en association avec des aliments et des boissons

Evitez une consommation exagérée d'alcool pendant le traitement.

Grossesse

Rien n'indique que des doses normales de PERDOLAN, administrées pendant la grossesse, soient nocives pour le fœtus. Toutefois, la prudence est conseillée pendant les trois premiers mois de la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement :

Les quantités de paracétamol excrétées dans le lait maternel sont si faibles qu'elles ne comportent aucun risque pour le nourrisson.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Capacité de conduire un véhicule et d'utiliser des machines

L'utilisation de PERDOLAN n'influence pas la vigilance, le pouvoir de concentration et la capacité de conduire un véhicule.

Information importante concernant certains composants de PERDOLAN

Sans application

Utilisation de PERDOLAN en association avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez (ou avez utilisé récemment) d'autres médicaments, même s'il s'agit de médicaments délivrés sans ordonnance.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser PERDOLAN si vous êtes traité(e) par des médicaments contre l'épilepsie. Si PERDOLAN est utilisé en même temps que des médicaments qui freinent la coagulation, un contrôle régulier du sang peut s'avérer nécessaire. Evitez la consommation exagérée d'alcool pendant le traitement.

Remarque pour les diabétiques : PERDOLAN peut influencer la mesure du glucose sanguin (glycémie). Consultez votre médecin ou l'infirmier/-ère qui s'occupe de votre diabète.

3. Comment utilise-t-on PERDOLAN ?

Suivez attentivement ces instructions à moins que votre médecin ne vous ait donné d'autres directives. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Comment l'utiliser et en quelle quantité?

L'intervalle habituel entre deux administrations est de 4 heures au moins. On réduira la dose en cas de troubles du foie.

Comprimés et comprimés effervescents :

Enfants :

à partir de 25 kg (8 ans) : 1/2 comprimé oblong ou effervescent, jusqu'à 6 fois par jour;
à partir de 50 kg (14 ans) : 1 à 2 comprimés ou effervescents, jusqu'à 3 fois par jour.

Adultes :

1 à 2 comprimés ou effervescents, jusqu'à 3 fois par jour.

Prendre maximum 6 comprimés ou effervescents par jour et maximum 2 comprimés ou effervescents par administration.

De par leur forme particulière, les comprimés sont plus faciles à avaler que les comprimés ordinaires. Il est préférable de les prendre avec un peu de liquide. Les comprimés effervescents doivent être totalement dissous dans un demi-verre d'eau. Les comprimés et effervescents comportent une rainure permettant de les diviser en deux.

Suppositoires à 500 mg pour adultes :

1 à 2 suppositoires, jusqu'à 3 fois par jour.

Administrer au maximum 6 suppositoires par jour et 2 suppositoires à la fois. En humidifiant le suppositoire, on en facilitera l'introduction.

Mode d'administration

Les comprimés sont à prendre par la bouche.

Les comprimés effervescents sont à prendre par la bouche après dissolution dans l'eau.

Les suppositoires doivent être introduits dans l'anus.

Que devez-vous faire si vous oubliez d'utiliser PERDOLAN ?

Sans application

Manifestations qui peuvent être attendues lorsque le traitement par PERDOLAN est arrêté

Sans application

Que devez-vous faire si vous avez utilisé plus de PERDOLAN que vous ne le pouviez ?

Lors de tout surdosage, vous devez contacter d'urgence le médecin, le pharmacien ou le centre Antipoison (070.245.245), même lorsque l'intoxication est seulement soupçonnée et qu'aucun symptôme n'est encore apparent, afin que les mesures nécessaires puissent être prises rapidement. Les premiers signes qui apparaissent après un surdosage sont le vomissement, la transpiration, une sensation générale de malaise et des maux de ventre. La toxicité pour le foie est la principale complication d'un surdosage.

4. Effets indésirables possibles lors de l'utilisation de PERDOLAN

Comme tous les médicaments, PERDOLAN peut avoir des effets indésirables.

Des réactions d'hypersensibilité sont extrêmement rares ; le cas échéant, elles se présentent sous la forme d'éruptions de la peau.

Exceptionnellement, on peut voir apparaître de graves troubles du foie et d'importants changements dans le sang.

Si vous éprouvez d'autres effets indésirables, veuillez les signaler à votre médecin ou votre pharmacien

5. Comment doit-on conserver PERDOLAN?

PERDOLAN doit être conservé à une température ne dépassant pas 25°C. Les comprimés effervescents PERDOLAN doivent être protégés contre l'humidité.

Conservez le médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Date limite d'utilisation

L'abréviation "exp." sur l'emballage signifie que le médicament ne peut plus être utilisé après le premier jour du mois qui suit l'abréviation (les deux premiers chiffres indiquent le mois, les suivants l'année).

6. Information complémentaire

Pour toute information ayant trait à ce médicament, prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien.

Mode de délivrance

Belgique : 20 comprimés, 20 comprimés effervescents et 12 suppositoires : exempts de prescription médicale

30, 100 (emballage clinique) comprimés : sur prescription médicale ou sur demande écrite

Luxembourg : Exempt de prescription médicale.

Date de la dernière mise à jour de cette notice : 11/2009

Date d'approbation de cette notice : 12/2009