

---

## Publieksbijsluiter PERDOLAN – VOLWASSENEN

**Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.**

Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.

- *Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.*
- *Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.*
- *Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet verbeteren.*

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN gebruikt.
3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN.
5. Hoe bewaart u PERDOLAN?
6. Aanvullende informatie

### **PERDOLAN volwassenen 500 mg, zetpillen**

### **PERDOLAN volwassenen 500 mg, tabletten**

### **PERDOLAN 500 mg, bruistabletten**

De werkzame stof is paracetamol.

Zetpillen *volwassenen* bevatten 500 mg paracetamol per zetpil.

Andere bestanddelen zijn siliciumdioxide, halfsynthetische glyceriden, polysorbaat 20, butylhydroxyanisol en butylhydroxytolueen.

Tabletten bevatten 500 mg paracetamol per tablet.

Andere bestanddelen zijn maïszetmeel, povidon K30, natriumcroscarmellose, siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

Bruistabletten bevatten 500 mg paracetamol per tablet.

Andere bestanddelen zijn aspartaam, anhydrisch citroenzuur, sinaasappelaroma, mannitol, macrogol 6000, kaliumcarbonaat, kaliumbicarbonaat, povidon K30, natriumsaccharine, simeticone, anhydrisch natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, natriumchloride, natriumcitraat en natriumlaurylsulfaat.

### **Registratiehouder**

Johnson & Johnson Consumer N.V.  
Roderveldlaan 1  
B-2600 Berchem

### **Fabrikant**

#### Zetpillen voor volwassenen, tabletten

Cilag AG  
Hochstrasse 201  
8205 Schaffhausen  
Zwitserland

#### Bruistabletten

Hermes Pharma GmbH  
Allgäu 36  
9400 Wolfsberg  
Oostenrijk

### **Registratienummer**

Zetpillen Volwassenen: BE 147691

Tabletten: BE 145853

Bruistabletten: BE 232215

## **1. Wat is PERDOLAN en waarvoor wordt het gebruikt?**

#### Zetpillen:

De zetpillen *volwassenen* zijn beschikbaar in een verpakking met 12 zetpillen;

#### Tabletten:

De tabletten zijn beschikbaar in een doordrukverpakking met 20, 30, 100 (kliniekverpakking) tabletten.

#### Bruistabletten:

De bruistabletten zijn beschikbaar in een verpakking met 20 bruistabletten met deelgleuf.

PERDOLAN is een pijnstillend en koortswerend middel.

PERDOLAN is aangewezen bij het verlichten van pijn en koortstoestanden.

PERDOLAN is als pijn- en koortswerend middel een geschikt en veilig alternatief voor personen die overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur of die om bepaalde redenen (bestaande maagklachten of maagzweer, behandeling met anti-stollingsmiddelen, astma) het best geen geneesmiddelen gebruiken die stoffen zoals acetylsalicylzuur bevatten

## **2. Wat u moet weten voordat u PERDOLAN gebruikt.**

### **Gebruik PERDOLAN niet:**

- Als u een ernstig verminderde werking van de nieren of de lever vertoont, raadpleeg in ieder geval eerst uw arts;
- Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van PERDOLAN of voor paracetamol of fenacetine.

### **Pas goed op met PERDOLAN:**

- als u lijdt aan een ernstige leverziekte;
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek "Gebruik van PERDOLAN in combinatie met andere geneesmiddelen" te lezen.

Dit geneesmiddel bevat paracetamol. Vermijd langdurig gebruik en stop de behandeling zodra de pijn of koorts verdwenen is. Overschrijd de voorgeschreven of aanbevolen doses niet. Raadpleeg uw arts als de pijn of koorts aanhoudt.

Perdolan bruistabletten bevatten een kleine hoeveelheid natrium (144 mg/tablet).

Personen die een streng zoutarm dieet volgen, dienen eerst hun arts te raadplegen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

### **Gebruik van PERDOLAN in combinatie met voedsel en drank**

Vermijd overdreven gebruik van alcohol tijdens de behandeling.

### **Zwangerschap**

Er zijn geen aanwijzingen dat normale doses PERDOLAN, toegediend tijdens de zwangerschap, nadelig zouden zijn voor de foetus. Voorzichtigheid is toch aangeraden gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

### **Borstvoeding**

De hoeveelheden paracetamol die in de moedermelk uitgescheiden worden, zijn zo klein dat ze geen enkel risico inhouden voor de zuigeling.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Het gebruik van PERDOLAN heeft geen invloed op de waakzaamheid, het concentratievermogen en de rijvaardigheid.

### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PERDOLAN**

Niet van toepassing

### **Gebruik van PERDOLAN in combinatie met andere geneesmiddelen**

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens PERDOLAN te gebruiken als u behandeld wordt met geneesmiddelen tegen vallende ziekte (epilepsie). Bij gelijktijdig gebruik van PERDOLAN en geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen, kan een regelmatige controle van het bloed nodig zijn.

Noot voor diabetici: PERDOLAN kan de meting van uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Raadpleeg uw arts of diabetesverpleegkundige.

### **3. Hoe wordt PERDOLAN gebruikt?**

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

#### **Hoe gebruiken en hoeveel?**

Het gebruikelijke tijdsinterval tussen twee toedieningen is minstens 4 uur. Bij leverinsufficiëntie moet de dosis worden verlaagd.

#### Tabletten en bruistabletten:

##### *Kinderen:*

vanaf 25 kg (8 jaar): 1/2 tablet of bruistablet, tot 6 maal per dag;

vanaf 50 kg (14 jaar): 1 à 2 tabletten of bruistabletten, tot 3 maal per dag.

##### *Volwassenen:*

1 à 2 tabletten of bruistabletten, tot 3 maal per dag.

Maximaal 6 tabletten of bruistabletten per dag en maximaal 2 tabletten of bruistabletten per keer innemen. De staafvormige tabletten zijn door hun speciale vorm gemakkelijker in te slikken dan gewone tabletten. Ze kunnen het best met wat vloeistof worden ingenomen. De

bruistablet volledig laten oplossen in een half glas water. De tabletten en bruistabletten hebben een deelgleuf, zodat ze gemakkelijk doormidden kunnen worden gebroken.

Zetpillen à 500 mg voor volwassenen:

1 à 2 zetpillen, tot 3 maal per dag.

Maximaal 6 zetpillen per dag en maximaal 2 zetpillen per keer toedienen.

Het inbrengen van de zetpillen wordt vergemakkelijkt door ze te bevochtigen.

**Toedieningswijze**

Tabletten om in te nemen langs de mond.

Bruistabletten om in te nemen langs de mond na oplossing in water.

Zetpillen om aan te brengen in de aars.

**Wat u moet doen wanneer u PERDOLAN vergeet te gebruiken**

Niet van toepassing

**Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PERDOLAN wordt gestopt**

Niet van toepassing

**Wat u moet doen als u meer van PERDOLAN heeft gebruikt dan zou mogen**

Bij elke overdosering moet u dringend contact opnemen met uw arts, apotheker of met het Antigifcentrum (070.245.245), zelfs bij vermoeden van intoxicatie en wanneer nog geen symptomen aanwezig zijn, zodat snel de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

De eerste symptomen die na een overdosering optreden, zijn : braken, zweten, een algemeen onbehaaglijkheidsgevoel en buikpijn. Levertoxiciteit is de voornaamste verwikkeling van een overdosering.

**4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOLAN**

Zoals alle geneesmiddelen kan PERDOLAN bijwerkingen hebben.

Overgevoeligheidsreacties in de vorm van huiduitslag worden uiterst zelden waargenomen.

Uitzonderlijk kunnen ernstige leverproblemen en veranderingen in het bloed ontstaan.

Indien u andere ongewenste effecten ondervindt, gelieve deze te melden aan uw arts of apotheker.

**5. Hoe bewaart u PERDOLAN?**

PERDOLAN mag niet boven 25°C worden bewaard. PERDOLAN bruistabletten moeten worden beschermd tegen vocht.

Houd het geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen.

### **Uiterste gebruiksdatum**

De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het middel vervalst op de eerste dag van de maand die na de afkorting vermeld staat (de eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende het jaar).

### **6. Aanvullende informatie**

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

### **Afleveringswijze**

België: 20 tabletten, 20 bruistabletten en 12 zetabletten: vrij van medisch voorschrift.

30,100 (kliniekverpakking) tabletten: op medisch voorschrift of schriftelijke aanvraag.

Luxemburg: vrij van medisch voorschrift.

**Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 11/2009.**

**De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is 12/2009.**