

NOTICE PUBLIQUE

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament peut être obtenu sans prescription médicale. Vous devez néanmoins utiliser PERDOFEMINA avec le plus grand soin pour pouvoir en obtenir les meilleurs résultats.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, consultez votre pharmacien.

Consultez votre médecin si les symptômes s'aggravent ou ne s'améliorent pas au bout de quelques jours.

Contenu de cette notice :

1. Qu'est-ce que PerdoFemina et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PerdoFemina ?
3. Comment utiliser PerdoFemina ?
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver PerdoFemina ?
6. Informations supplémentaires

PERDOFEMINA, comprimés pelliculés

Lysinate d'ibuprofène

Le composant actif est le lysinate d'ibuprofène.

Chaque comprimé pelliculé de PERDOFEMINA contient 684 mg de lysinate d'ibuprofène (équivalent à 400 mg d'ibuprofène).

Les autres ingrédients sont : povidone, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, hypromellose, hydroxypropylcellulose, dioxyde de titane (E171).

Titulaire de l'enregistrement

Johnson & Johnson Consumer S.A.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Belgique

Fabricant

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen
I-04010 Borgo San Michele (Latina)
Italie

Numéro d'enregistrement

BE 228453

1. Qu'est-ce que PERDOFEMINA et dans quel cas est-il utilisé?

PERDOFEMINA est disponible dans un emballage de 20 comprimés.

PERDOFEMINA est un médicament actif contre la douleur et la fièvre.

PERDOFEMINA est indiqué pour le soulagement de la douleur et des états fébriles.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PERDOFEMINA ?

N'utilisez pas PERDOFEMINA si :

- Vous êtes hypersensible (allergique) à l'un des ingrédients du médicament ou à un autre médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (comme l'aspirine ou l'ibuprofène). Chez les patients qui sont hypersensibles à d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, des réactions croisées peuvent se produire.
- Si vous souffrez d'un ulcère dans l'estomac ou au début de l'intestin grêle.
- Si vous avez déjà souffert d'asthme après l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (comme l'aspirine ou l'ibuprofène).
- Si vous avez moins de 12 ans.
- Si vous vous trouvez au troisième trimestre de votre grossesse.

Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez PERDOFEMINA

Si vous souffrez actuellement – ou avez souffert dans le passé – d'asthme ou si vous avez présenté un ulcère de l'estomac, des troubles de la coagulation ou des saignements anormaux, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser PERDOFEMINA.

Si la douleur est encore présente au bout de 5 jours de prise de PERDOFEMINA, vous devez consulter votre médecin.

Si la douleur s'intensifie ou si d'autres symptômes apparaissent, vous devez arrêter le traitement et consulter votre médecin.

Si vous souffrez de graves troubles rénaux, vous devez consulter votre médecin avant de prendre PERDOFEMINA.

Des médicaments tels que PERDOFEMINA peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque ("infarctus du myocarde") ou d'attaque. Le

risque augmente au fur et à mesure que la dose avalée augmente et que la durée d'utilisation du médicament se prolonge. N'utilisez pas plus que la dose prescrite et pas plus longtemps que la durée recommandée du traitement (5 jours).

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu une attaque ou si vous pensez que vous appartenez à un groupe à risque à cet égard (par exemple si vous avez trop de tension artérielle, un diabète ou un taux élevé de cholestérol, ou si vous fumez), vous devez en parler avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Utilisation de PERDOFEMINA en association avec des aliments et des boissons.

Non applicable

Grossesse

L'utilisation de PERDOFEMINA pendant la grossesse n'est pas recommandée. Comme pour tout médicament, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser PERDOFEMINA si vous êtes enceinte ou si pensez l'être.

Allaitement

L'utilisation de PERDOFEMINA pendant l'allaitement n'est pas recommandée. Comme pour tout médicament, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser PERDOFEMINA si vous allaitez.

Conduite d'un véhicule et utilisation de machines

Chez certaines personnes sensibles, PERDOFEMINA peut provoquer des sensations d'étourdissement ou de la fatigue. Si vous éprouvez des sensations d'étourdissement, vous ne devez pas conduire de véhicule et vous devez éviter d'utiliser des machines ou d'accomplir d'autres activités dangereuses requérant de la vigilance.

Informations importantes concernant certains composants de PERDOFEMINA

Non applicable

Utilisation de PERDOFEMINA en association avec d'autres médicaments

Vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser PERDOFEMINA en même temps que des corticostéroïdes sous forme orale ou injectable ou d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (comme l'aspirine ou l'ibuprofène), du lithium, des substances qui inhibent la coagulation sanguine, du méthotrexate, de la phénytoïne, des médicaments qui favorisent l'élimination d'eau (diurétiques) ou de certains produits qui abaissent la tension artérielle.

3. Comment utiliser PERDOFEMINA ?

Suivez scrupuleusement ces instructions à moins que votre médecin ne vous ait donné d'autres recommandations. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Comment l'utiliser et en quelle quantité ?

A partir de 12 ans: 1 comprimé trois fois par jour jusqu'à la disparition des symptômes. L'intervalle de temps entre deux prises consécutives doit être de 4 heures au minimum. Le traitement doit être instauré dès l'apparition des premiers symptômes. Il est même indiqué de commencer le traitement la veille du déclenchement prévu des menstruations (règles). Ne prenez pas PERDOFEMINA plus de 5 jours sans consulter votre médecin. Ne prenez jamais plus de 3 comprimés par jour.

PERDOFEMINA agira plus rapidement si vous prenez le médicament avec un peu d'eau. En cas de maux d'estomac, vous pouvez prendre le médicament avec des aliments.

Mode d'administration

Comprimés pelliculés à prendre par la bouche.

Que devez-vous faire si vous avez oublié de prendre PERDOFEMINA?

Non applicable

Manifestations auxquelles vous pouvez vous attendre lorsque le traitement par PERDOFEMINA est arrêté

Non applicable

Que devez-vous faire si vous avez utilisé plus de PERDOFEMINA que vous n'auriez dû ?

En cas de surdosage, vous devez consulter immédiatement votre médecin. Dites-lui de quel médicament il s'agit et en quelle quantité vous l'avez pris.

Des doses trop élevées de ce médicament peuvent provoquer les symptômes suivants : somnolence, nausée, vomissements et maux de ventre.

Dans les cas graves, votre médecin prendra immédiatement les mesures qui s'imposent.

Informations pour le médecin: il peut s'avérer indiqué de procéder à un lavage gastrique ou d'induire des vomissements puis d'administrer du charbon activé.

4. Effets indésirables éventuels pendant l'utilisation de PERDOFEMINA

Les effets indésirables les plus fréquents sont sensations d'étourdissement, fatigue, maux de tête, troubles de la digestion, diarrhée, nausée et éruption de la peau. Les effets indésirables moins fréquents sont des saignements dans le tube digestif, des réactions d'hypersensibilité (éruption de la peau et gonflement), une crise d'asthme et une aggravation de la fonction des reins.

Des médicaments tels que PERDOFEMINA peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque ("infarctus du myocarde") ou d'attaque .

Si vous manifestez des symptômes inhabituels, vous devez consulter votre médecin.

5. Comment conserver PERDOFEMINA?

Aucune instruction de conservation particulière.

Tenir le médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Date d'expiration

L'abréviation "exp." sur l'emballage signifie que le médicament est périmé le premier jour du mois qui est mentionné après l'abréviation (les deux premiers chiffres indiquent le mois et les suivants, l'année).

6. Informations supplémentaires

Pour toute information concernant ce médicament, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode de délivrance

PERDOFEMINA est exempt de prescription médicale.

La dernière révision de cette notice date du mois de 11/2009

L'approbation de cette notice date de 12/2009