

PUBLIEKSBIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.

Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOFEMINA zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.

Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.

Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na een aantal dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is PerdoFemina en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u PerdoFemina inneemt.
3. Hoe wordt PerdoFemina gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PerdoFemina?
6. Aanvullende informatie

PERDOFEMINA, filmomhulde tabletten

Ibuprofenlysinaat

De werkzame stof is ibuprofenlysinaat.

PERDOFEMINA filmomhulde tabletten bevatten 684 mg ibuprofenlysinaat (gelijkwaardig aan 400 mg ibuprofen) per tablet.

Andere bestanddelen zijn: povidone, microcristallijn cellulose, magnesiumstearaat, hypromellose, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide (E171).

Registratiehouder

Johnson & Johnson Consumer N.V.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

België

Fabrikant

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele (Latina)

Italië

Registratienummer

BE 228453

1. Wat is PERDOFEMINA en waarvoor wordt het gebruikt?

PERDOFEMINA is beschikbaar in een verpakking met 20 tabletten.

PERDOFEMINA is een pijnstillend en koortswerend middel.

PERDOFEMINA is aangewezen bij het verlichten van pijn en koortstoestanden.

2. Wat u moet weten voordat u PERDOFEMINA inneemt.

Gebruik PERDOFEMINA niet:

- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor één van de bestanddelen van het geneesmiddel of voor een ander niet-steroïdaal ontstekingsremmend middel (zoals aspirine of ibuprofen). Bij patiënten die overgevoelig zijn voor andere niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen kunnen kruisreacties optreden.
- Als u een maagzweer of een zweer aan het begin van de dunne darm hebt.
- Als u ooit last van astma hebt gehad na het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (zoals aspirine of ibuprofen).
- Als u minder dan 12 jaar oud bent.
- Als u in het derde trimester van uw zwangerschap bent.

Pas goed op met PERDOFEMINA

Als u aan astma lijdt of hebt geleden, als u een maagzweer hebt gehad, of als u stollings- of bloedingstoornissen hebt gehad, moet u uw arts raadplegen voor u PERDOFEMINA gebruikt.

Als u PERDOFEMINA inneemt en als de pijn na 5 dagen nog aanwezig is, moet u uw arts raadplegen.

Als de pijn verergert of als er andere symptomen verschijnen, moet u de behandeling stopzetten en uw arts raadplegen.

Als u een ernstig nierprobleem hebt, moet u uw arts raadplegen voor u PERDOFEMINA gebruikt.

Geneesmiddelen zoals PERDOFEMINA kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer

dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (5 dagen).

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van PERDOFEMINA in combinatie met voedsel en drank .

Niet van toepassing

Zwangerschap

Het gebruik van PERDOFEMINA tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. Zoals voor alle geneesmiddelen moet u uw arts raadplegen vóór het gebruik van PERDOFEMINA als u zwanger bent of meent te zijn.

Borstvoeding

Het gebruik van PERDOFEMINA tijdens de borstvoeding wordt niet aanbevolen. Zoals voor alle geneesmiddelen moet u uw arts raadplegen vóór het gebruik van PERDOFEMINA als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

PERDOFEMINA kan bij bepaalde gevoelige patiënten duizeligheid of vermoeidheid teweegbrengen. Als u zich duizelig voelt, mag u geen wagen besturen en moet u vermijden machines te gebruiken of andere gevaarlijke activiteiten uit te oefenen die waakzaamheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PERDOFEMINA

Niet van toepassing

Gebruik van PERDOFEMINA in combinatie met andere geneesmiddelen

U mag PERDOFEMINA niet gebruiken samen met corticosteroiden in orale of injecteerbare vormen of andere niet-steroidale ontstekingsremmende geneesmiddelen (zoals aspirine of ibuprofen), lithium, producten die de bloedstolling remmen, methotrexaat, fenytoïne, vochtafdrijvende geneesmiddelen of sommige producten die de bloeddruk verlagen zonder uw arts te raadplegen.

Hoe wordt PERDOFEMINA ingenomen?

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Hoe gebruiken en hoeveel?

Vanaf 12 jaar: 1 tablet driemaal per dag tot de symptomen zijn verdwenen. De tijd tussen 2 opeenvolgende inname moet minstens 4 uur zijn.

De behandeling moet worden gestart van zodra de eerste symptomen optreden; het is zelfs aan te bevelen de behandeling te beginnen één dag vóór de te verwachten maandstonden. Neem PERDOFEMINA niet langer dan 5 dagen zonder uw arts te raadplegen. Neem nooit meer dan 3 tabletten per dag in.

Om PERDOFEMINA sneller te doen werken, neemt u het geneesmiddel bij voorkeur met een beetje water in. Als u last hebt van uw maag, kunt u het geneesmiddel innemen met wat voedsel.

Toedieningswijze

Filmomhulde tabletten om in te nemen langs de mond.

Wat u moet doen wanneer u PERDOFEMINA vergeet te gebruiken

Niet van toepassing

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PERDOFEMINA wordt gestopt

Niet van toepassing

Wat u moet doen als u meer van PERDOFEMINA heeft ingenomen dan zou mogen:

In geval van overdosering moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Zeg hem om welk geneesmiddel het gaat en hoeveel er werd ingenomen.

Te hoge doses van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken: slaperigheid, misselijkheid, braken en buikpijn.

In ernstige gevallen zal uw arts meteen de nodige maatregelen nemen.

Informatie voor de arts: maagspoeling of inductie van braken kan aangewezen zijn, gevolgd door toediening van actieve kool.

4. Mogelijke bijwerkingen tijdens het gebruik van PERDOFEMINA

De vaakst voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen, diarree, misselijkheid en huiduitslag. Minder vaak voorkomende

bijwerkingen zijn bloedingen in het spijsverteringskanaal, overgevoeligheidsreacties (huiduitslag en zwelling), een astma-aanval en een verslechtering van de nierfunctie.

Geneesmiddelen zoals PERDOFEMINA kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

Als er ongebruikelijke symptomen optreden, moet u uw arts raadplegen.

5. Hoe bewaart u PERDOFEMINA?

Geen bijzondere voorzorgen voor de bewaring.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum

De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalst op de eerste dag van de maand die na de afkorting vermeld staat (de eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende het jaar).

6. Aanvullende informatie

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Afleveringswijze

PERDOFEMINA is vrij van medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 11/2009

De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is 12/2009